斜斑鼓额食蚜蝇和黑带食蚜蝇各虫期形态描述

张君明, 王 兵, 虞国跃*

(北京市农林科学院植物保护环境保护研究所, 北京 100097)

摘要: 食蚜蝇作为蚜虫重要的捕食性天敌, 其捕食蚜虫的虫态是幼虫期。针对目前研究以描述食蚜蝇成虫的形态特征进行种类鉴定为主, 而对卵及幼虫的描述却很少的现状, 采集野外2种常见的食蚜蝇——斜斑鼓额食蚜蝇 (*Scaeva pyrastris*) 和黑带食蚜蝇 (*Episyrphus balteata*), 对其卵、幼虫、蛹及成虫4个虫态进行描述, 并提供彩色照片, 这对于其早期鉴定极为重要。

关键词: 斜斑鼓额食蚜蝇; 黑带食蚜蝇; 形态学; 幼期

Morphological Descriptions of Four Stages of *Scaeva pyrastris* (Linnaeus) and *Episyrphus balteata* (De Geer)

ZHANG Junming, WANG Bing, YU Guoyue*

(Institute of Plant and Environment Protection, Beijing Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Beijing 100097, China)

Abstract: As an important predatory natural enemy, *Syrphidae* mainly preyed on the larval stage. According to the current situation that the morphological characteristics of adults of *Syrphidae* were mainly described, but the description of eggs and larvae were very few, two kinds of common *Syrphidae* (*Scaeva pyrastris* and *Episyrphus balteata*) were collected from the field. It was very important for the early identification to describe the insect states (eggs, larvae, pupae and adults) and provide relevant colour pictures.

Keywords: *Scaeva pyrastris* (Linnaeus); *Episyrphus balteata* (De Geer); morphology; immature stage

食蚜蝇属于双翅目 (Diptera)、食蚜蝇科 (Syrphidae), 其幼虫和成虫具有重要的生态价值: 大多数成虫访花, 对植物的授粉具有重要意义, 而约1/3种类的幼虫捕食蚜虫等昆虫, 是重要的天敌昆虫。研究发现, 在有蚜虫的寄主植物

上, 最常见的是天敌食蚜蝇的幼期 (即卵、幼虫和蛹)^[1]。

由于食蚜蝇的重要性, 国外早在20世纪初期就开始研究食蚜蝇幼虫、蛹和卵的形态^[2-3]。我国的食蚜蝇种类非常丰富, 已记录580种, 还有

收稿日期: 2019-10-15

基金项目: 北京市农林科学院科技创新能力建设专项 (KJCX20180416)。

*通讯作者: 虞国跃

已知的90种未列入^[4]，而对食蚜蝇幼期研究相对较晚，早期研究种类较多的是针对新疆9种食蚜蝇的幼虫形态，以及部分卵和蛹的形态描述^[5]。对卵的显微研究，则是储西平等^[6]应用扫描电子显微镜，对南京常见的24种食蚜蝇卵壳的形态描述。

在农田中，斜斑鼓额食蚜蝇 (*Scaeva pyrastri*)^[7] 和黑带食蚜蝇 (*Episyrphus balteata*)^[8-9] 是捕食性食蚜蝇类群中的优势种类，在抑制蚜虫为害方面作用明显；但在其种类鉴定上，大多数是以描述成虫的形态特征为主，而对卵及幼虫的描述却很少。本文将对斜斑鼓额食蚜蝇和黑带食蚜蝇的4个虫态进行描述，并提供彩色照片，供鉴定参考（彩色鉴定图片详见封三）。

1 研究方法

从田间采回食蚜蝇卵及各龄幼虫，置于9 cm 培养皿中饲养，提供蚕豆饲养的豌豆修尾蚜 (*Megoura crassicauda* Mordvilko, 1919)，直至其羽化为成虫，用以物种鉴定；或从野外采集食蚜蝇成虫，将其放置在饲养笼中 (45 cm × 45 cm × 45 cm)，笼中放有1盆饲养豌豆修尾蚜的蚕豆苗，使其产卵，获得所需的卵及其他虫态。保留成虫标本，用以物种鉴定。在饲养中，有多头个体时，分别用酒精浸泡，至少保存1头各虫态标本。

用数码相机对卵及各虫态拍照，卵的细微结构采用数码相机对着尼康体视镜 (SMZ1500) 的目镜拍摄；并对其各虫态特征进行描述。

2 形态描述

对斜斑鼓额食蚜蝇和黑带食蚜蝇的形态进行描述，使生产者知道这是害虫的天敌，应该保护利用，而不要当作害虫杀灭。

2.1 斜斑鼓额食蚜蝇

2.1.1 成虫

体长12.3~14.8 mm，翅展21~24 mm。额黄色，触角褐色，各节腹部基部色淡。眼部具密毛，雄虫接眼，雌虫离眼。中胸盾片黑绿色，具有金属光泽。小盾片浅棕色，密生黑色长毛。腹部黑色，第2~4节背板各有1对黄斑，第1对平置，第2、3对斜置呈新月形，前缘凹入明显，

第4、5节背板后缘黄色。足为黄色，前、中足腿节基部1/3及后足腿节基部4/5黑色，跗节黑色。

2.1.2 卵

长1.06~1.30 mm，宽0.43~0.45 mm。乳白色，长卵形，一端稍变细。背面花纹条状，细长，明显小于条纹的间距，两侧具有细小的分枝，常与相邻的条纹相连接。背面与腹面花纹分界明显，位于卵侧的中部，似有1~2行的过渡区，条纹略粗，具较少的细小分枝。腹面花纹条状，较粗，大于两条纹的间距，条纹边缘无细枝，有时仅见瘤状突起。

2.1.3 幼虫

初孵幼虫淡黄色。老熟幼虫长13.5~15.5 mm，虫体爬行时身体可略变长。整体淡草绿色，背中具有白色纵带，向腹末稍变宽，并染粉红色彩。体两侧肉刺明显，每一体节背面有2对瘤突，中部1对着生于稍前的位置，瘤突端部着生1根毛；体侧也具有类似的小丘。臀板中上部凹陷，每侧有3个突起，后呼吸器黄色，气门板近圆形，两气门管很短，端面紧靠在一起。每气门管端部有气门裂3个，下方2个，外上方1个。

2.1.4 蛹

围蛹，头端膨大，初化蛹时为乳白色，接近羽化时为褐色，蛹长8.5~9.1 mm，宽3.5~4.0 mm。体中部后背处有2条白色带，中间有1条细纹，腹部末端残留幼虫期后气门痕迹。

2.2 黑带食蚜蝇

2.2.1 成虫

体长10.1~12.2 mm，翅展19~21 mm。额淡黄色，中央及新月片上方灰黑色，颜毛淡黄色，新月片橘黄色。复眼红色。触角第3节卵圆形，底色黄褐色，各节具有黑色横带。前胸背板黑色，中央及两侧灰色纵条，中胸盾片黑色，有光泽，具有4条亮黑色纵条。小盾片黄色，中央毛黑色，四周毛黄色。腹部长圆形，底色黄褐色，第2腹节背板基部中央具页黑斑，第2、3节背板后缘具有黑带，第4节近后缘具有黑带，第3、4节亚基部具有1条较短的黑色横带；第5背板黑斑较小。

2.2.2 卵

长圆筒形，一端略小，长0.85 mm左右，宽

0.33 mm左右。近乳白色,即将孵化时为灰白色。卵壳背面花纹条状,表面有很多微孔,侧突发达,在相邻花纹间有很多接触,腹面花纹呈不规则的框形,边缘锯齿状。

2.2.3 幼虫

初孵幼虫淡白色。老熟幼虫体长9.1~12.0 mm,宽2.5~3.0 mm。蛆形,末端截状略扁,较透明,背部血管和气管可通过半透明的体壁隐约可见。体背后胸和腹部第4~5节中央有2条白色纵带,后半部较宽,两纵线间呈淡褐色。体表多环纹并密布小突起。由体表常透见体内物质形成的黑褐色大斑,黑斑前端呈叉状,后端大而钝圆,化蛹前体内物质排出,黑斑消失。臀板中上部不凹陷,每侧2个突起。气门管端面紧靠在一起,每气门管端部有气门裂3个,内侧上方的1个较短,各气门裂之间有1个小突起。

2.2.4 蛹

围蛹,头端膨大,末端急细,长6.2 mm,宽2.9 mm,上有3~4条粗细不匀的棕色横纹,位于体中部的2条横纹在背线处明显后凸。体中后部背线处有2个棕色圆点。腹部末端残留幼虫期后气门痕迹。

3 小结

我国的食蚜蝇种类非常丰富,其幼虫和成虫具有重要生态价值。食蚜蝇在我国分布范围很广,作为重要的天敌昆虫,幼虫以多种蚜虫为食,成虫大多数访花,对植物的授粉具有重要意义。食蚜蝇的种类鉴定大多数都是以描述成虫的形态特征为主,而对卵及有幼虫的描述却很少。早春,很容易在一些植物的嫩叶上采集到食蚜蝇的卵。从野外采集到的斜斑鼓额食蚜蝇的几粒卵,发现由于寄主植物的不同,食蚜蝇卵的表面花纹有些许变异。这里描述的与Chandler^[10]给出的图并不完全相同。

体色变异在食蚜蝇科昆虫中是一种较为普遍的现象,在系统学研究中已有大量记载^[11],如黑带食蚜蝇的成虫,其斑纹变化非常大^[12]。从野外采集以及在实验室饲养的黑带食蚜蝇幼虫,发现个体间由于体表透明,体内黑褐色大斑的颜色深浅有变化,这可能与幼虫的饲养温度有关^[13],也

可能与食物有关。研究发现斜斑鼓额食蚜蝇取食的猎物蚜虫(如早春无宝枫上的多态毛蚜,或侧柏上的柏长足大蚜)为褐色时,它自己的体色也为褐色。食蚜蝇体型和颜色的变异及其行为的拟态现象,丰富了食蚜蝇类群的多样性,但也给食蚜蝇的识别带来了一定的困难。

已有文献对食蚜蝇的幼虫和卵的描述较少。本文对食蚜蝇的非成虫期(卵、幼虫及蛹)的形态特征进行了描述,对于成虫的描述相对简单,有关这2种食蚜蝇成虫的特征可参考黄春梅等^[4]、霍科科等^[14]的描述。

参考文献

- [1] 郑祥义,原国辉.麦田常见食蚜蝇幼虫的鉴别[J].昆虫知识,1996,33(4):196-197.
- [2] METCALF C L. Syrphidae of maine[J]. Maine Agricultural Experiment Station,1916,253:261-264.
- [3] METCALF C L. Preliminary report on the life-histories of two species of Syrphidae[J]. The Ohio Naturalist,1911,11(7):337-346.
- [4] 黄春梅,成新跃.中国动物志昆虫纲(第50卷)[M].北京:科学出版社,2012:837.
- [5] 杨海峰,马祁.玛纳斯捕食性食蚜蝇幼虫期的记述[J].新疆八一农学院学报,1984(4):13-18.
- [6] 储西平.食蚜蝇科卵壳超微形态初探[J].昆虫学报,1992,35(3):294-300.
- [7] 熊汉忠,董慧芳.斜斑鼓额食蚜蝇成虫发生动态、产卵习性及其控制温室蚜虫的作用[J].生物防治通报,1991,7(2):49-52.
- [8] 杨友兰,王红武,王全寿,等.山西菜田捕食性食蚜蝇优势种及其对菜蚜的控制效果[J].中国生物防治,2002,18(3):124-127.
- [9] 杨承泽,何运转,李腾武,等.麦田食蚜蝇种群组成及生物学特性的研究[J].河北农业大学学报,1994,17(增刊1):167-172.
- [10] CHANDLER A E F. A preliminary key to the eggs of some of the commoner aphidophagous Syrphidae (Diptera) occurring in Britain[J]. Ecological Entomology,1968,120(8):199-217.
- [11] 霍科科,张宏杰.食蚜蝇科昆虫体色变异的研究进展[J].汉中师范学院学报,2004,22(2):60-66.

6种杀虫剂对湘南地区Q型烟粉虱的 药效试验

唐 锸, 余席茂, 肖昌华, 谭美丽, 刘小安, 欧阳忠耀

(衡阳市蔬菜研究所, 湖南 衡阳 421001)

摘要: 为了筛选出安全高效的防治Q型烟粉虱的化学药剂(组合), 开展了6种杀虫剂对湘南地区Q型烟粉虱的防治效果试验。结果表明: 22.4%螺虫乙酯1 500倍液对烟粉虱卵的灭杀效果最佳, 10%吡丙醚750倍液+22.4%螺虫乙酯1 500倍液对烟粉虱若虫的防效最好, 10%溴氰虫酰胺1 000倍液+22.4%螺虫乙酯1 500倍液对烟粉虱成虫的防效最佳; 在对湘南地区防治Q型烟粉虱的实际操作中, 选用22.4%螺虫乙酯、10%吡丙醚、10%溴氰虫酰胺3种药剂进行复配喷施可取得理想的防治效果。

关键词: Q型烟粉虱; 杀虫剂; 毒力测定

Efficacy of Six Insecticides Against *Bemisia tabaci* Biotype Q in Southern Hu'nan

TANG E, YU Ximao, XIAO Changhua, TAN Meili, LIU Xiao'an, OUYANG Zhongyao

(Hengyang Institute of Vegetables, Hengyang 421001, China)

Abstract: In order to select safe and efficient chemical agents (combinations) for the control of *Bemisia tabaci* biotype Q, the efficacy tests of 6 insecticides on *Bemisia tabaci* biotype Q in southern Hu'nan were carried out. The results showed that 22.4% spirotetramat 1 500 times solution had the best killing effect on the eggs of *Bemisia tabaci* biotype Q, 10% pyrrolyl ether 750 times solution + 22.4% spirotetramat 1 500 times solution had the best controlling effect on the nymphs of *Bemisia tabaci* biotype Q, 10% bromocyanamide 1 000 times solution + 22.4% spirotetramat 1 500 times solution had the best controlling

收稿日期: 2019-08-19

基金项目: 国家大宗蔬菜产业技术体系项目 (Cars-23-G-30)。

[12] 霍科科, 郑哲民. 黑带食蚜蝇体色变异的研究[J]. 昆虫知识, 2003, 40(6): 529-534.

[13] MARRIOTT C G, HOLLOWAY G J. Colour pattern plasticity in *Episyrphus balteatus*: the critical immature stage and reaction norm on

developmental temperature[J]. Journal of Insect Physiology, 1998, 44: 113-119.

[14] 霍科科, 任国栋, 郑哲民. 秦巴山区食蚜蝇区系分类[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2007: 512.

A. 雌成虫；B. 雄成虫；C. 卵；D. 卵背面；E. 幼虫；F. 蛹腹部末端（示气门）；G. 蛹
图 1 斜斑鼓额食蚜蝇

A. 雌成虫；B. 雄成虫；C. 卵；D. 卵背面；E. 幼虫；F. 蛹
图 2 黑带食蚜蝇

图片内容详见内文第71~73页。